

**PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati. Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista. Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.



**MOMENDOL 5%  
GEL**

**Composizione**

100 g contengono:

**Principi attivi:** naprossene sodico g 5,482 (pari a naprossene g 4,983); glucoronil glucosaminoglicano g 0,200 (attività anticoagulante in confronto a Eparina 20-40 UI/mg).

**Eccipienti:** Alcool isopropilico; Glicerolo; Idrossietilcellulosa; Profumo mentolato; Acqua demineralizzata.

**Come si presenta**

Momendol 5% gel si presenta sotto forma di tubo contenente gel per uso esterno. Ogni tubo contiene 50 g di gel.

**Che cosa è**

Momendol 5% gel è un farmaco non steroideo ad azione analgesica, antinfiammatoria ed antireumatica, che combatte il dolore e l'infiammazione dei muscoli e delle articolazioni.

La presenza nel gel del glucoronil glucosaminoglicano facilita il riassorbimento di eventuali ecchimosi ed ematomi.

**Titolare della autorizzazione all'immissione in commercio**

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., viale Amelia 70, 00181 Roma

**Produttore e controllore finale**

A.C.R.A.F. S.p.A.  
Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona

**Perché si usa**

Momendol 5% gel si usa localmente per combattere il dolore dovuto a

**traumi** come ad esempio: contusioni, distorsioni e strappi muscolari, lussazioni, ecchimosi, ematomi, edemi localizzati e infiltrati traumatici, etc; oppure a

**fenomeni infiammatori** come ad esempio: torcicollo, lombalgie, fibromiositi, tendiniti, borsiti, tenosinoviti, periartriti, flebiti etc.

Momendol 5% gel può essere usato come coadiuvante nella terapia artroreumatica (artrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante).

**Quando non deve essere usato**

Ipersensibilità verso i componenti o verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico: (es. acido acetilsalicilico, ecc.).

**Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico**

Età pediatrica (vedere "È importante sapere che").  
Gravidanza e allattamento (vedere "Cosa fare durante la gravidanza e allattamento").  
Pazienti sottoposti a terapia con anticoagulanti di tipo cumarinico (warfarin, dicumarolo etc.) (vedere "Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale").

**Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento**

Nelle donne in stato di gravidanza o che allattano, Momendol 5% gel deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Consultate il medico se sospettate uno stato di gravidanza o desiderate pianificare una maternità.

**Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale**

Non usate Momendol 5% gel se state seguendo una terapia a base di anticoagulanti di tipo cumarinico (warfarin, dicumarolo etc.).

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

**È importante sapere che**

Il prodotto non va applicato su ferite o lesioni cutanee.

In età pediatrica Momendol 5% gel deve essere usato solo dopo aver consultato il medico ed aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

L'applicazione del prodotto non altera la capacità di guida e l'uso di altri macchinari.

Per evitare eventuali fenomeni di ipersensibilità o di fotosensibilizzazione evitare l'esposi-

(segue)

zione alla luce solare diretta, compreso il solarium, durante il trattamento e nelle due settimane successive.

**Note di Educazione Sanitaria**

Piccoli traumi di tipo accidentale, possono provocare lesioni senza ferita (contusioni), caratterizzate da dolore della zona colpita, da piccole emorragie superficiali (ecchimosi), oppure più profonde ed intense (ematoma) e gonfiore generalizzato della zona interessata (edema).

Anche posture errate, esercizi ginnici troppo intensi e prolungati, sforzi muscolari non abituali o improvvisi, possono creare dolori ai muscoli, ai tendini e alle articolazioni dovuti a fenomeni infiammatori circoscritti (fibromiositi, tendiniti, borsiti, tenosinoviti, periartriti).

Le lesioni traumatiche come distorsioni, lussazioni e strappi muscolari, possono insorgere con dolore e gonfiore improvvisi. In questo caso è necessario sospendere l'attività fisica e potrebbe essere di aiuto applicare un analgesico meglio se caratterizzato anche da una azione antinfiammatoria. Se il dolore persiste, accompagnato da gonfiore dell'area interessata e da eventuale ridotta funzionalità dell'arto, è necessario rivolgersi al medico.

**Come usare questo medicinale**

**Quanto**

2-3 applicazioni al giorno.

Attenzione: non superare le tre applicazioni al giorno se non dietro precisa indicazione del medico.

**Quando e per quanto tempo**

Applicare il farmaco all'occorrenza, in qualsiasi momento della giornata.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

**Come**

Spalmate il gel sulla parte dolente e massaggiare leggermente fino a completo assorbimento.

**Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale**

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Momendol 5% gel, avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale. Portate con voi questo foglietto illustrativo.

**Effetti indesiderati**

Con alcuni antinfiammatori non steroidei ad uso topico cutaneo o transdermico, derivati dell'acido propionico, sono state segnalate reazioni avverse cutanee con eritema, prurito, irritazione, sensazione di calore o bruciore e dermatiti da contatto. Sono stati segnalati anche alcuni casi di eruzioni bollose di varia gravità. Sono possibili reazioni di fotosensibilità.

In tal caso interrompete il trattamento e consultate il medico.

*Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.*

*Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.*

*E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.*

*Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (modello B).*

**Scadenza e conservazione**

*Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.*

*Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.*

*E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.*

**Revisione del foglio illustrativo da parte dell' Agenzia Italiana del Farmaco:**

Maggio 2007.

