

PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati. Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista. Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.



TANTUM VERDE P

3 mg pastiglie
gusto limone
benzidamina cloridrato

Composizione

Una pastiglia contiene:

Principio attivo: benzidamina cloridrato mg 3 (pari a benzidamina 2,68 mg).

Eccipienti: Isomalto (E 953), Aspartame (E 951), Acido citrico monoidrato, Aroma limone, Aroma menta, Giallo chinolina (E 104), Indigotina (E 132).

Come si presenta

Tantum Verde P, si presenta sotto forma di pastiglie translucide verdi chiare di forma quadrata con incavo centrale e con caratteristico gusto al limone.

Ogni scatola di pastiglie gusto limone contiene 20 o 30 pastiglie.

Che cosa è

Tantum Verde P, è un farmaco per uso orale locale efficace per il trattamento dei processi irritativi della bocca e della gola.

Tantum Verde P manifesta anche un'azione anestetica locale di media intensità.

Titolare della autorizzazione all'immissione in commercio

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia 70, 00181 Roma

Produttore

Disch AG (Gruppo Ricola) - Othmarsingen (Svizzera).

Controllore finale

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

Perché si usa

Tantum Verde P, si usa per il trattamento sintomatico del dolore e delle irritazioni (che si manifestano con bruciore, arrossamento, senso di gonfiore, difficoltà nella deglutizione) della bocca e della gola.

Quando non deve essere usato

Ipersensibilità verso i componenti o verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Per il tipo di forma farmaceutica, la somministrazione delle pastiglie di Tantum Verde P deve essere limitata a bambini sopra dei sei anni.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

Gravidanza e allattamento (vedere "Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento").

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Nelle donne in stato di gravidanza o che allattano, Tantum Verde P pastiglie deve essere usato quando è realmente necessario solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Consultate il medico se sospettate uno stato di gravidanza o desiderate pianificare una maternità.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

È importante sapere che

In un numero limitato di pazienti le ulcerazioni oro-faringee possono essere segno di patologie più gravi. Pertanto, nel caso in cui i sintomi dovessero perdurare per più di tre giorni, il paziente deve rivolgersi al proprio medico o dentista a seconda delle necessità.

L'uso della benzidamina è sconsigliato in pazienti con ipersensibilità all'acido salicilico o ad altri FANS.

Il prodotto deve essere somministrato con cautela in soggetti che in passato hanno avuto episodi di asma bronchiale, in quanto in questo tipo di pazienti potrebbero intervenire fenomeni

(Segue)

di broncospasmo.

Nei bambini tra i 6 e 11 anni si consiglia l'assunzione sotto il controllo di una persona adulta.

Il dolcificante aspartame contiene un derivato della fenilalanina e perciò può essere pericoloso per pazienti affetti da fenilchetonuria.

Il prodotto contiene isomalto: se siete a conoscenza di soffrire di intolleranza a qualche zucchero, consultate il medico prima di assumere questo medicinale.

Tantum Verde P sono pastiglie senza zucchero (pertanto possono essere usate anche da pazienti affetti da iperglicemia o sottoposti a diete ipocaloriche con necessità di evitare l'assunzione dello zucchero) e contengono aspartame come dolcificante.

Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca.

L'uso del prodotto alle dosi consigliate non altera la capacità di guida e l'uso di altri macchinari.

Note di Educazione Sanitaria

Alcune condizioni ambientali, quali abbassamento o sbalzi di temperatura, innalzamento del tasso di umidità, ecc., possono provocare l'irritazione delle prime vie respiratorie, perché favoriscono l'attacco da parte dei germi patogeni. La sintomatologia caratteristica comprende, fra l'altro, bruciore, dolore alla gola, difficoltà alla deglutizione.

Per non aggravare tali sintomi, è utile evitare alcuni fattori ulteriormente irritanti quali il fumo, l'aria secca, i luoghi affollati, ecc. .

Come usare questo medicinale

Quanto

Una pastiglia 3 volte al giorno.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo

Assumere il farmaco all'occorrenza, in qualsiasi momento della giornata.

Non usare per più di 7 giorni di trattamento.

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Come

Per ottenere il massimo beneficio, si consiglia di sciogliere lentamente la pastiglia in bocca.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

Con la formulazione pastiglie non è stato riporta-

to alcun caso di sovradosaggio.

In caso di sovradosaggio svuotare lo stomaco provocando vomito o con lavanda gastrica ed osservare il paziente dando un trattamento di supporto e mantenendo un'adeguata idratazione.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Tantum Verde P pastiglie, avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale. Portate con voi questo foglio illustrativo.

Effetti indesiderati

Disturbi gastrointestinali

Rari (> 1/10.000, < 1/1000):

Bruciore della bocca

Secchezza della bocca

Disturbi del sistema immunitario

Rari (> 1/10.000, < 1/1000):

Reazioni di ipersensibilità

Disturbi respiratori, toracici, mediastinici

Molto rari (< 1/10.000)

Laringospasmo

Disordini del tessuto cutaneo e sottocutaneo

Non comuni (> 1/1000, < 1/100)

Fotosensibilità

Molto rari (< 1/10.000)

angioedema

Il rispetto delle istruzioni contenute sul foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

Vedere la data di scadenza riportata sulla confezione. Tale data si intende per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare a temperatura non superiore ai 25°C e nella confezione originale.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agencia Italiana del Farmaco:
Febbraio 2006

