

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto se explica:

1. Qué es **Ciprofloxacino-lepori** y para qué se utiliza
2. Antes de usar **Ciprofloxacino-lepori**
3. Cómo usar **Ciprofloxacino-lepori**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **Ciprofloxacino-lepori**

Ciprofloxacino-lepori 0,3% colirio en solución
Ciprofloxacino

El principio activo es ciprofloxacino (DCI) presente en la solución en forma de clorhidrato. Cada ml de colirio en solución contiene 3 mg de este principio activo.

Los demás componentes son cloruro de benzalconio (conservante), edetato disódico, manitol, ácido acético, acetato sódico, hidróxido sódico, ácido clorhídrico, agua bidestilada.

Titular: FARMA-LEPORI, S.A.

C. Osi, 7 - 08034 Barcelona

Responsable de la fabricación: Laboratorio Edol - Productos Farmacéuticos, S.A.

Av. 25 de Abril, 6. 2796-902 Linda-a-Velha (Portugal)

1. QUÉ ES Ciprofloxacino-lepori Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Este colirio se presenta en un envase con 5 ml. Está incluido en el grupo de antiinfecciosos para administración oftalmológica (excluidos los antivirales)

Este medicamento está indicado en el tratamiento de úlceras corneales e infecciones superficiales del ojo y párpados, causadas por bacterias susceptibles.

2. ANTES DE APLICARSE Ciprofloxacino-lepori

No use Ciprofloxacino-lepori:

- Si usted es alérgico a las quinolonas
- Si usted muestra alergia a cualquier componente del producto.
- Si usted está utilizando soluciones alcalinas.
- En niños menores de 1 año.

Tenga especial cuidado con Ciprofloxacino-lepori:

- Cuando lo utilice en niños mayores de 1 año, ya que la experiencia en niños es limitada.
- Cuando efectúe un uso prolongado, ya que, como cualquier preparación antibacteriana, puede dar lugar a la aparición de resistencias bacterianas.
- Si le apareciera una erupción cutánea o cualquier otro signo de reacción alérgica, usted debe suspender el tratamiento.

Embarazo:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Dado que no se han realizado estudios controlados en mujeres embarazadas, este medicamento sólo se usará durante el embarazo si los beneficios justifican los posibles riesgos para el feto.

Lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

No se conoce si el ciprofloxacino administrado tópicamente en el ojo es excretado con la leche humana y, por ello, deberá consultar a su médico antes de utilizar **Ciprofloxacino-lepori** durante el período de lactancia.

Conducción y uso de máquinas:

No hay ningún efecto conocido que impida ponerse el producto previamente o durante la conducción de vehículos o el uso de maquinaria.

Información importante sobre algunos de los componentes de Ciprofloxacino-lepori:

Este medicamento, por contener cloruro de benzalconio como excipiente, puede decolorar las lentes de contacto blandas.

Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

No se han realizado estudios específicos de interacción con el **Ciprofloxacino-lepori**.

3. CÓMO APLICARSE Ciprofloxacino-lepori

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas:

- Destape el frasco con las manos recién lavadas, procurando no tocar con la punta del gotero los dedos, el ojo, o cualquier otra superficie para evitar una posible contaminación.
- Sujete el frasco con el dedo pulgar y el medio.
- Con la cabeza inclinada hacia atrás, separe el párpado inferior hacia abajo y, golpeando suavemente la base del envase con el índice aplique una o dos gotas en la cavidad que se forma (denominada saco conjuntival), mientras dirige la mirada hacia arriba.
- Parpadee suavemente varias veces, manteniendo la cabeza inclinada hacia atrás.
- Cierre bien el frasco después de su uso.

Recuerde usar su medicamento.

Siga siempre la posología recomendada por su médico.

La dosificación estándar para los casos indicados a continuación es la siguiente:

Adultos y niños mayores de 1 año:

- **Úlceras corneales: Ciprofloxacino-lepori** deberá ser administrado en cada ojo afectado, incluso durante la noche, según los siguientes intervalos:
1er. día de tratamiento: 2 gotas cada 15 minutos durante las primeras 6 horas, continuando con 2 gotas cada 30 minutos durante el resto del día.
2º día de tratamiento: 2 gotas cada hora.
Días 3-14 de tratamiento: 2 gotas cada 4 horas.
En caso necesario, se podrá extender el tratamiento más de 14 días, con la frecuencia de administración indicada por el médico.
- **Otras infecciones oculares: Ciprofloxacino-lepori** deberá ser administrado en cada ojo afectado sólo durante el día, según los siguientes intervalos:
1er. y 2º día de tratamiento: instilar 1 ó 2 gotas dentro del saco conjuntival del ojo afectado cada 2 horas.
3er. día de tratamiento: 1 ó 2 gotas cada 4 horas hasta que la infección bacteriana haya desaparecido.

Si estima que la acción de **Ciprofloxacino-lepori** es demasiado fuerte o débil, comuníquelo a su médico o farmacéutico.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con **Ciprofloxacino-lepori**. No suspenda el tratamiento antes, ya que puede eliminar el efecto esperado.

No deberá utilizar **Ciprofloxacino-lepori** más de 21 días a menos que su médico se lo indique.

Ciprofloxacino-lepori debe utilizarse por vía oftálmica, es decir, debe ponérselo en los ojos.

Si usted usa más Ciprofloxacino-lepori del que debiera:

Consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico, si usted ha utilizado más solución oftálmica de lo que debía.

En caso de sobredosificación tópica de **Ciprofloxacino-lepori**, éste puede ser eliminado del ojo con agua templada.

En caso de sobredosis o ingestión accidental acuda a un centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, Tel. 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó utilizar Ciprofloxacino-lepori:

No se administre una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, **Ciprofloxacino-lepori** puede tener efectos adversos.

Tras la utilización del producto puede producirse quemazón y molestia ocular, como picor, sensación de cuerpo extraño, descamación en el párpado, enrojecimiento del ojo y mal sabor de boca.

A veces, puede producirse tinción o inflamación de la córnea, reacciones alérgicas, hinchazón del párpado, lagrimeo, sensibilidad a la luz, partículas en la córnea, náuseas y disminución de la visión.

Pueden aparecer reacciones alérgicas.

En algunos pacientes con úlcera corneal se han observado precipitados blancos dentro del ojo tras la administración entre las 24 h y los 7 primeros días de tratamiento, los cuales desaparecerán después de la aplicación continua de **Ciprofloxacino-lepori**.

Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE Ciprofloxacino-lepori

Mantenga **Ciprofloxacino-lepori** fuera del alcance y de la vista de los niños.

- No se precisan condiciones especiales de conservación.
- Mantener el envase perfectamente cerrado.

Caducidad

No utilizar **Ciprofloxacino-lepori** después de la fecha de caducidad indicada en la caja o en la etiqueta.

Después de haber abierto el envase, los colirios en solución no deben ser usados más de un mes.

Este prospecto ha sido aprobado en Octubre 2001.



Farma-Lepori
C. Osi, 7 - 08034 Barcelona