

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

1. Qué es **Condrosulf 400 mg cápsulas** y para qué se utiliza
2. Antes de tomar **Condrosulf 400 mg cápsulas**
3. Cómo tomar **Condrosulf 400 mg cápsulas**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **Condrosulf 400 mg cápsulas**

Condrosulf 400 mg cápsulas
Condroitín sulfato

El principio activo es condroitín sulfato. Cada cápsula contiene 400 mg de condroitín sulfato. Los demás componentes (excipientes) son: estearato de magnesio. La composición de la cápsula es: gelatina, dióxido de titanio, amarillo de quinoleína (E-104), indigotina (E-132).

Titular

FARMA-LEPORI, S.A.

C. Osi, 7 - 08034 Barcelona

Responsable de la fabricación

IBSA Institut Biochimique, S.A.

Via al Ponte, 13. 6903 Lugano (Suiza)

1. QUÉ ES Condrosulf 400 mg cápsulas Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Condrosulf se presenta en forma de cápsulas duras para administración oral, disponible en envases de 60 unidades. Pertenece al grupo de los antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos.

Condrosulf está indicado en el tratamiento sintomático de la artrosis.

2. ANTES DE TOMAR Condrosulf 400 mg cápsulas

No tome Condrosulf®

- Si usted es alérgico a condroitín sulfato o a cualquiera de los componentes de este medicamento.

Tenga especial cuidado con Condrosulf

- Si usted padece alguna enfermedad grave del riñón, del hígado o del corazón.

Consulte a su médico, incluso si cualquiera de las circunstancias anteriormente mencionadas le hubieran ocurrido alguna vez.

Embarazo

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

No se recomienda tomar **Condrosulf** durante el embarazo.

Lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

No se recomienda tomar **Condrosulf** durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

No es de esperar que **Condrosulf** afecte la capacidad de conducir vehículos y utilizar máquinas.

Toma con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

La administración de **Condrosulf**, a dosis muy superiores a las recomendadas, junto con algún medicamento antiagregante plaquetario para prevenir la trombosis, tales como ácido

acetilsalicílico, dipiridamol, clopidrogel, ditazol, trifusal y ticlopidina, podría aumentar levemente el efecto de los medicamentos anteriormente citados.

3. **CÓMO TOMAR Condrosulf 400 mg cápsulas**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con **Condrosulf**. No suspenda el tratamiento antes, ya que su eficacia podría verse reducida.

Se recomienda la administración de 2 cápsulas de **Condrosulf** (dosis diaria total: 800 mg) al día, preferiblemente en una sola toma (2 cápsulas a la vez) durante al menos 3 meses. No obstante, en pacientes con sintomatología inflamatoria importante, y siempre que el médico lo considere oportuno, podrá iniciarse el tratamiento con una dosis de 1.200 mg (3 cápsulas al día, en una sola toma o en 2 tomas) durante las primeras 4 ó 6 semanas para seguir con 800 mg (2 cápsulas al día preferiblemente en una sola toma) hasta completar el período de administración de al menos 3 meses.

Si estima que la acción de **Condrosulf** es demasiado fuerte o débil comuníquese a su médico o farmacéutico.

Condrosulf se administrará como mínimo durante 3 meses, tras los cuales se realizará un período de descanso de 2 meses, para posteriormente volver a reiniciar el tratamiento siguiendo el mismo ciclo.

Las cápsulas deben tomarse sin masticar. Se pueden tomar antes, durante o después de las comidas, con una cantidad suficiente de líquido.

Si usted ha tomado más **Condrosulf** del que debiera, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico, acuda al hospital más cercano o consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420. Lleve este prospecto con usted.

Si olvidó tomar Condrosulf

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

4. **POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, **Condrosulf** puede provocar efectos adversos.

En raras ocasiones se ha descrito la aparición de náuseas y/o alteraciones gastrointestinales, que generalmente no requieren la suspensión del tratamiento. En muy raras ocasiones en pacientes con insuficiencia renal y/o cardíaca se ha descrito algún caso de edema y/o retención de agua.

En muy raras ocasiones se ha comunicado alguna reacción de tipo alérgico.

Si observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. **CONSERVACIÓN DE Condrosulf 400 mg cápsulas**

Mantenga **Condrosulf** fuera del alcance y de la vista de los niños.

Conservar en el envase original.

Conservar protegido de la humedad.

Caducidad

No utilizar **Condrosulf** después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

Este prospecto ha sido aprobado en febrero 2002



FARMA-LEPORI, S.A.
C. Osi,7 – 08034 Barcelona