

## **FALCOL® DIFUCREM**

### **Aceclofenaco**

#### **COMPOSICIÓN**

Por 100 g de crema:

aceclofenaco (DOE) .....1,5 g

Excipientes: palmitoestearato de sorbitán polioxietileno, alcohol cetosteárico, vaselina líquida, parahidroxibenzoato de metilo (E-218), parahidroxibenzoato de propilo (E-216), agua purificada.

#### **FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE**

Envase conteniendo 60 g de crema.

#### **ACTIVIDAD**

Aceclofenaco está dotado de actividad antidolorosa, antiinflamatoria y antirreumática.

La administración de aceclofenaco en forma de crema, permite el tratamiento local de procesos dolorosos e inflamatorios.

#### **TITULAR Y FABRICANTE**

**Titular:** FARMA-LEPORI, S.A.

C. Osi, 7

08034 Barcelona

**Fabricado por:** Industrias Farmacéuticas ALMIRALL PRODEFARMA, S.L.

C. Treball, s/n

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

#### **INDICACIONES**

Todo tipo de procesos dolorosos e inflamatorios locales, incluyendo traumatismos y patología inflamatoria musculoesquelética aguda o crónica, tales como tendinitis, tenosinovitis, esguinces, luxaciones, periartritis, distensiones, lumbago y tortícolis.

#### **CONTRAINDICACIONES**

No deberá aplicarse en aquellos pacientes que hayan mostrado hipersensibilidad a aceclofenaco u otros antiinflamatorios no esteroideos incluyendo el ácido acetilsalicílico.

#### **PRECAUCIONES**

No debe aplicarse en los ojos, en mucosas o en heridas abiertas. Asimismo, no es aconsejable su uso si en la zona de aplicación existe algún proceso de irritación cutánea. En caso de hipersensibilidad debe suspenderse el tratamiento.

#### **INTERACCIONES**

No se conocen interacciones de **Falcol® Difucrem** con otros fármacos.

#### **ADVERTENCIAS**

**Embarazo y lactancia:** No son suficientes los datos de los que se dispone hasta la fecha, por lo que se recomienda no utilizar el producto en caso de embarazo o lactancia.

**Efectos sobre la capacidad de conducción:** La aplicación de **Falcol® Difucrem** no incide sobre dicha capacidad.

**Uso en niños:** No se han establecido aún las dosis ni las indicaciones recomendadas para niños.

**Uso en ancianos:** El tratamiento con **Falcol® Difucrem** no requiere especial atención.

### **POSOLOGÍA**

Se aplicará por vía tópica mediante un suave masaje sobre la zona afectada, entre 1,5 - 2 g de crema (aproximadamente entre 5 y 7 cm) tres veces al día, dependiendo de la extensión de la misma.

### **SOBREDOSIS**

No se ha presentado hasta el momento. En caso de ingestión masiva, se tratará desde el punto de vista sintomático. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

### **REACCIONES ADVERSAS**

En algunos casos puede producirse irritación ligera o moderada, enrojecimiento y prurito que desaparecen con la interrupción del tratamiento.

En casos aislados se han observado reacciones de fotosensibilidad. Si observase cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

### **CONSERVACIÓN**

No conservar a temperatura superior a 30°C.

### **CADUCIDAD**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### **OTRAS PRESENTACIONES**

**Falcol® comprimidos**, envase con 20, 40 y 500 comprimidos recubiertos de 100 mg

**Falcol® sobres**, envase con 20 y 40 sobres de 100 mg

**Falcol® inyectable**, envase con 4 viales liofilizados de 150 mg y 4 ampollas disolvente, y envase con 100 viales liofilizados de 150 mg y 100 ampollas disolvente.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños**

**TEXTO REVISADO:** Abril 2004.



FARMA-LEPORI, S.A.  
C. Osi, 7-9 - 08034 Barcelona