

FOLHETO INFORMATIVO

Fenolip, 10 mg / 0,5 ml, colírio solução

Leia atentamente este folheto antes de tomar o medicamento

- Conserve este Folheto Informativo. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outras pessoas; o medicamento pode ser-lhes prejudicial, mesmo que apresentem os mesmos sintomas.

Nome do Medicamento

Fenolip, 10 mg / 0,5 ml, colírio, solução

Composição Qualitativa e Quantitativa

1 ml colírio solução contém:

Substância Activa: Cromoglicato dissódico: 20 mg

Forma Farmacêutica e respectivo conteúdo

Colírio, solução, 20 unidoses de 0,5 ml

Categoria farmaco-terapêutica

Grupo farmacoterapêutico: 15.2.3 - Medicamentos usados em afecções oculares, Antiinflamatórios; Outros anti-inflamatórios, descongestionantes e antialérgicos.

Código ATC: S01GX01

Titular da autorização de comercialização

L. Lepori, Lda

Rua João Chagas, 53 - Piso 3

1495-764 Cruz Quebrada - Dafundo

Indicações terapêuticas

Conjuntivite alérgica (aguda e crónica): conjuntivite da febre dos fenos ([querato] conjuntivite sazonal).

Contra-Indicações e efeitos secundários

Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes deste medicamento. Em casos raros pode ocorrer sensação de ardor, de corpo estranho ou hiperemia conjuntival. Podem ser observadas reacções alérgicas em casos isolados, após tratamento com cromoglicato dissódico.

Interações medicamentosas e outras formas de interacção

Não há referências.

Precauções especiais de utilização

Não são conhecidas

Efeitos em grávidas, lactentes, crianças, idosos e doentes com patologias especiais

Embora não se tenham observado quaisquer efeitos embriotóxicos, o Fenolip, colírio solução, se possível, não deve ser utilizado durante os 3 primeiros meses de gravidez.

Não há estudos da utilização de cromoglicato dissódico por mães a amamentar pelo que a sua prescrição a mães a amamentar deva ser feita com precaução avaliando a relação risco benefício.

Em relação aos outros grupos não há referências. Consultar o seu médico.

Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas

Não são conhecidas quaisquer limitações à condução de veículos ou uso de máquinas.

Lista dos Excipientes

Sorbitol, Hidroxipropilmetilcelulose, Água para preparações injectáveis e Ácido clorídrico.

Posologia e modo de administração

Instilar 1 gota em cada olho 4 vezes ao dia. A dosagem aplica-se igualmente aos adultos e às crianças com mais de 4 anos.

O tratamento com Fenolip, colírio solução deverá ser continuado, mesmo após o desaparecimento das queixas, em situações em que os pacientes estejam expostos ao alérgeno (polén, pó, esporos de fungos, etc)

Indicação do momento mais favorável à administração do medicamento

Consultar o seu médico

Instruções sobre a atitude a tomar quando for omitida uma ou mais doses

Se for omitida a administração de uma ou mais doses o tratamento deve continuar.

Indicação de como suspender o tratamento, se a sua suspensão causar efeitos de privação

Não é necessária qualquer precaução especial para a suspensão do tratamento.

Medidas a adoptar em caso de sobredosagem e/ou intoxicação, sintomas, medidas de urgência e antídotos

Não são de considerar casos de sobredosagem.

Aconselhamento ao utente

Se verificar algum efeito secundário que não conste da respectiva rubrica deste folheto deve comunicá-lo ao seu médico ou ao farmacêutico.

Verifique se o medicamento se encontra dentro do prazo de validade inscrito na embalagem.
Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Data da revisão do folheto

Janeiro de 2006