

FOLHETO INFORMATIVO

Hipercol

Leia todo este Folheto Informativo com atenção antes de começar a utilizar este produto

- Conserve este Folheto Informativo. Pode ser necessário voltar a lê-lo .
- Se tiver alguma dúvida, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi-lhe receitado a si e não deve dá-lo a outras pessoas; pode prejudicá-las, mesmo que os sintomas sejam os mesmos que os seus.

Neste Folheto Informativo:

1. O que é Hipercol e para que se utiliza.
2. Antes de utilizar Hipercol.
3. Como utilizar Hipercol.
4. Efeitos secundários possíveis.
5. Conservação de Hipercol.

Denominação do medicamento

HIPERCOL

Substância activa: Citicolina

Outras substâncias (excipientes): Sorbitol, glicerina, nipagin, nipazol, álcool, carboximetilcelulose, citrato de sódio, sacarina sódica, vermelho Ponceau, essência de morango, ácido cítrico.

Nome e morada do Titular da Autorização de Introdução no Mercado

ANGELINI FARMACÊUTICA, LDA.
Rua João Chagas 53, Piso 3,
1495-072 Algés

1. O QUE É O HIPERCOL e PARA QUE SE UTILIZA?

HIPERCOL é um medicamento psicoestimulante, sob a forma de solução transparente, de cor vermelha com odor a morango, para administração oral. Cada ml de solução oral contém 100 mg de Citicolina.

Embalagens com 1 frasco contendo 50 ml de solução oral e respectiva seringa doseadora.

Categoria Fármaco-terapêutica

2.8- Psicoestimulantes e psicanalépticos

Indicações Terapêuticas

Acidente vascular cerebral e traumatismos cranianos.

2. ANTES DE USAR HIPERCOL

Contra-indicações

Deverá informar o seu médico se tem antecedentes de alergia ou hipersensibilidade a algum dos componentes deste produto.

Interações Medicamentosas e Outras

A citicolina potencia os efeitos da L-Dopa. A citicolina não apresenta interações significativas com heparina ou varfarina, nem com ácido acetilsalicílico (aspirina) ou activador do plasminogénio tissular (tPA).

Não deve administrar-se com medicamentos que contenham Meclofenoxato, por possível potenciação do seu efeito.

Precauções especiais de utilização

Não são necessárias precauções especiais para a utilização deste medicamento.

Gravidez e Aleitamento

Dada inexistência de estudos, em mulheres grávidas e/ou a amamentar, Hipercol não deve ser utilizado nestas situações.

Efeitos sobre a Capacidade de Condução e Utilização de Máquinas

Hipercol não afecta a capacidade de conduzir ou de utilizar máquinas.

3. COMO UTILIZAR HIPERCOL

Siga estas instruções, a menos que o seu médico lhe tenha dado outras indicações diferentes:

Posologia Usual, com Referência à Dose Máxima

Hipercol deve ser administrado por via oral.

Adultos: 100 a 200 mg (1-2 ml) 2 a 3 vezes ao dia.

Crianças: 100 mg (1 ml) 2 a 3 vezes ao dia.

Cada ml contém 100 mg de Citicolina.

Estas doses podem ser modificadas segundo critério médico.
Recomenda-se como dose de manutenção normal 1 ml, 3 vezes ao dia.

Modo de Emprego

HIPERCOL administra-se com a ajuda de uma seringa doseadora, conforme o esquema seguinte:

1. Com o êmbolo pressionado até ao fundo, introduzir a seringa doseadora no frasco.
2. Aspirar a dose indicada fazendo girar o êmbolo, de modo que o líquido contido na seringa coincida exactamente com o volume prescrito.
3. Administrar o medicamento, misturando-o com um pouco de água.

Depois de cada administração, lavar a seringa doseadora com água.

Duração do Tratamento Médio, quando deva ser limitado

A duração do tratamento será indicada pelo seu médico.

O que fazer em caso de esquecimento de uma ou mais doses:

Se for omitida a administração de uma ou mais doses, o tratamento deve continuar de acordo com a posologia previamente recomendada.

Indicação de como suspender o tratamento, se a sua suspensão causar efeitos de privação

Não é necessária qualquer precaução especial para a suspensão do tratamento.

Medidas a adoptar em caso de sobredosagem e/ou intoxicação sintomas de urgência e antídotos

Dada a baixa toxicidade do fármaco, não é previsível o aparecimento de intoxicações, mesmo nos casos em que acidentalmente se ultrapasse as doses terapêuticas recomendadas.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Hipercol poderá provocar uma ligeira diminuição da pressão arterial, durante o início do tratamento. Este efeito é reversível num curto espaço de tempo.

Se verificar algum efeito secundário que não se encontre descrito neste folheto, deverá comunicá-lo ao seu médico ou farmacêutico.

5. CONSERVAÇÃO DE HIPERCOL

Não utilizar este medicamento depois da data de validade marcada na embalagem.

Após cada utilização, certifique-se que o frasco ficou bem fechado.

Mantenha sempre os medicamentos fora do alcance e da vista das crianças.

Não guardar acima de 25°C.

Data da Revisão do Folheto

Outubro 2003