

## **VEROVEN® Cápsula 200 mg**

### **Leia atentamente este folheto antes de tomar o medicamento**

- Conserve este folheto informativo. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outras pessoas; o medicamento pode ser-lhes prejudicial, mesmo que apresentem os mesmos sintomas.

### **NOME DO MEDICAMENTO**

VEROVEN®

### **COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA**

Cada cápsula contém:

Substância activa: Hidrosmina: 200 mg.

### **FORMA FARMACÊUTICA E RESPECTIVO CONTEÚDO**

VEROVEN apresenta-se em embalagens de 20 e 60 cápsulas.

### **CATEGORIA FÁRMACO-TERAPÊUTICA**

Grupo farmacoterapêutico: 3.6 - Venotrópicos.

Código ATC: C05CA05 - Vasoprotectores; Agentes estabilizadores dos vasos capilares; Bioflavonóides.

### **TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO**

L. LEPORI, LDA.

R. João Chagas, nº 53 - Piso 3

1495-764 Cruz Quebrada - Dafundo

### **INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS**

O VEROVEN está indicado no tratamento dos sintomas da insuficiência venosa crónica dos membros inferiores, incluindo varizes.

### **CONTRA-INDICAÇÕES E EFEITOS SECUNDÁRIOS**

Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes.

O VEROVEN cápsulas é geralmente bem tolerado. Podem no entanto ocorrer, embora muito raramente, manifestações de alergia cutânea e ligeiro mal-estar gástrico.

### **INTERACÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS FORMAS DE INTERACÇÃO**

Não se conhecem interações entre o VEROVEN e outros medicamentos ou alimentos.

### **EFEITOS EM GRÁVIDAS, LACTENTES, CRIANÇAS, IDOSOS E DOENTES COM PATOLOGIAS ESPECIAIS**

O VEROVEN cápsulas pode ser usado durante a gravidez e o aleitamento.

Não se conhecem efeitos particulares do VEROVEN cápsulas em idosos ou indivíduos com doenças especiais.

### **EFEITO SOBRE A CAPACIDADE DE CONDUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS**

Não é de prever que o VEROVEN cápsulas afecte a capacidade de condução e de trabalho com máquinas.

### **LISTA DOS EXCIPIENTES**

Estearato de magnésio e Celulose microcristalina.

### **POSOLOGIA USUAL COM REFERENCIA À DOSE MÁXIMA**

Tomar uma cápsula, três vezes por dia, às refeições.

### **INDICAÇÃO DO MOMENTO MAIS FAVORÁVEL À ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO**

Segundo indicação médica, às refeições.

### **DURAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDIO, QUANDO DEVA SER LIMITADO**

A duração do tratamento depende da situação clínica e da sua evolução.

### **INSTRUÇÕES SOBRE A ATITUDE A TOMAR QUANDO FOR OMITIDA UMA OU MAIS DOSES**

Se for omitida a administração de uma ou mais doses o tratamento deve continuar.

## **INDICAÇÃO DE COMO SUSPENDER O TRATAMENTO, SE A SUA SUSPENSÃO CAUSAR EFEITOS DE PRIVAÇÃO**

Não é necessária qualquer precaução especial para a suspensão do tratamento.

## **MEDIDAS A ADOPTAR EM CASO DE SOBREDOSAGEM E/OU INTOXICAÇÃO, SINTOMAS, MEDIDAS DE URGÊNCIA E ANTÍDOTOS**

Não são conhecidos casos de sobredosagem, nem são de esperar efeitos tóxicos graves resultantes da ingestão acidental maciça de VEROVEN cápsulas.

No entanto, em tais casos o doente deve, por precaução, ser levado a um serviço de urgência hospitalar, onde serão tomadas as medidas necessárias.

## **ACONSELHAMENTO AO UTENTE**

Informe o seu médico ou farmacêutico sempre que ocorram efeitos indesejáveis, nomeadamente se não constam deste folheto.

Verifique o prazo de validade inscrito na embalagem. Não use este medicamento depois de ultrapassar esta data.

Mantenha o medicamento fora do alcance e da vista das crianças.

## **PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO**

Conservar em local fresco e seco.

## **DATA DA REVISÃO DO FOLHETO**

Maior de 2004.