

**PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL
FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

*per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista

*consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di tempo.

**ENTERUM 1 MILIARDO/5 ML spore sospensione orale
ENTERUM 2 MILIARDI/5 ML spore sospensione orale**

spore di Bacillus clausii

Composizione

ENTERUM 1 miliardo/5 ml spore sospensione orale

Ogni contenitore monodose contiene:

Principio attivo: spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente 1 miliardo

Eccipiente: Acqua depurata

ENTERUM 2 miliardi/5 ml spore sospensione orale

Ogni contenitore monodose contiene:

Principio attivo: Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente 2 miliardi

Eccipiente: Acqua depurata

L'antibiotico-resistenza si riferisce a: penicilline, cefalosporine, tetracicline, macrolidi, aminoglicosidi, novobiocina, cloramfenicolo, tiamfenicolo, lincomicina, isoniazide, cicloserina, rifampicina, acido nalidixico e acido pipemidico.

Come si presenta

Enterum si presenta sotto forma di sospensione orale. Astucci da 10 o da 20 contenitori monodose da 1 miliardo e da 10 o da 20 contenitori da 2 miliardi di spore. Il contenuto di ogni contenitore monodose è di 5 ml.

Che cos'è

Enterum è una sospensione di microrganismi antidiarroici.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia n. 70 - 00181 ROMA

Produttore e controllore finale:

Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.r.l.

Strada Paduni, 240 - 03012 Anagni (FR)

Perché si usa

Cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene.

Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici.

Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.

Quando non deve essere usato

Il prodotto non deve essere usato in caso di ipersensibilità ai suoi componenti.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Non esistono controindicazioni all'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento.

Precauzioni per l'uso

Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell'intervallo fra l'una e l'altra somministrazione di antibiotico.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Non sono note eventuali interazioni medicamentose a seguito di concomitante somministrazione di altri farmaci.

E' importante sapere che

L'eventuale presenza di corpuscoli visibili nei contenitori monodose di ENTERUM è dovuta ad aggregati di spore di *Bacillus clausii*, non è pertanto indice di prodotto alterato.

Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca.

Come usare questo medicinale

Quanto

ENTERUM 1 miliardo/5ml spore sospensione orale

Adulti: 4- 6 contenitori monodose al giorno;

bambini: 3 - 4 contenitori monodose al giorno;

lattanti: 2 - 3 contenitori monodose al giorno.

Salvo diversa prescrizione medica.

ENTERUM 2 miliardi/5ml spore sospensione orale

Adulti: 2 - 3 contenitori monodose al giorno;

bambini: 1 - 2 contenitori monodose al giorno;

lattanti: 1 - 2 contenitori monodose al giorno.

Salvo diversa prescrizione medica.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo

Somministrare ad intervalli regolari (3-4 ore), diluendo il contenuto in acqua (anche zuccherata), latte, tè, aranciata.

Nel caso di terapia antibiotica concomitante somministrare il preparato tra due successive somministrazioni di antibiotico.

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente nelle sue caratteristiche.

Come

Agitare il contenitore monodose e quindi diluirne il contenuto in acqua (anche zuccherata), latte, tè, aranciata.

Una volta aperto il contenitore, utilizzare il prodotto immediatamente per evitare l'inquinamento della sospensione.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

Non sono note manifestazioni cliniche da sovradosaggio.

Cosa fare se avete dimenticato di prendere una o più dosi

Continuare la terapia come da posologia consigliata.

Effetti dovuti alla sospensione del trattamento

Nessuno

Effetti indesiderati

Non sono stati segnalati a tutt'oggi effetti indesiderati con l'impiego del farmaco.

Comunicare al medico o al farmacista l'insorgenza di eventuali effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

Vedere la data di scadenza indicata sulla confezione. Tale data si intende per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

ENTERUM 2 MILIARDI/5 ML, 10 contenitori monodose: Nessuna speciale precauzione per la conservazione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco

15 Gennaio 2008